

بیماری‌های گیاهان رایج زینتی فضای سبز

بیماری‌های چنار

چنار درختی خزان کننده می باشد که ارتفاع آن تا ۳۷ متر بالغ می گردد. این درخت، سریع‌الرشد بوده و به فرم‌های ستونی گسترده یا منشعب دیده می شود. از جمله گونه‌های آن می توان *P. acerifolia* و *Platanus orientalis* را نام برد. در مناطقی با زمستان‌های سرد به خوبی رشد می کند. از این درخت به عنوان نقطه تاکید، پس زمینه، ایجاد مسیر، پوشاندن، ایجاد دیوار در فضای سبز باز، چمن‌ها و درخت خیابانی استفاده می شود.

آنتراکنوز چنار

این بیماری به وسیله قارچ *Apiognomonia veneta* ایجاد می شود. آلودگی توسط قارچ عامل روی سر شاخه‌ها و جوانه‌های در حال خواب در اواخر پاییز بعد از خزان صورت می گیرد. از علایم این بیماری می توان به سوختگی برگ و شاخه‌ها و در انتها مرگ زود هنگام گیاه اشاره کرد.



علائم شانکر سرشاخه (راست) و سوختگی برگ (چپ) در اثر آنتراکنوز چنار

بلایت شاخه و برگ

بلایت از مهمترین بیماریهای چنار می باشند که توسط قارچ (*Discula platani*) *Gonomonia platani* ایجاد می شوند. این بیماریها ممکن است به صورتهای زیر ظاهر شود:

- بلایت سرشاخه:

در بهار قبل از ظهور برگها نمایان می شود و باعث نابودی انتهایی سرشاخه های یکساله می شود.

- بلایت جوانه:

جوانه های متورم را از بین می برد.

- بلایت ساقه:

باعث مرگ انشعابات جدید و برگهای نابالغ روی آنها می شود.

- بلایت برگ:

برگها پیچیده و قهوه ای شده کل برگ ممکن است از بین رفته و ریزش پیدا کند.



مرحله بلایت برگی آنتراکنوز چنار

